

## Todacitan® nou medicament finançat per la deshabitució tabàquica

Des de l'1 de febrer, i sota determinades condicions, Todacitan® es pot prescriure amb finançament per la deshabitució tabàquica.

**Temps de lectura:** 2 minuts.

Todacitan® (citisina) és un medicament indicat en adults per al tractament de la dependència tabàquica i la reducció de l'ansietat de la dependència a la nicotina en fumadors que estiguin disposats a deixar de fumar.

Des de l'1 de febrer, i sota determinades condicions, aquest medicament es pot prescriure amb finançament per la deshabitució tabàquica.

Per fer-ho, cal que el pacient estigui inclòs en un programa de suport a la deshabitució tabàquica i que:

- Tingui **motivació expressa per deixar de fumar** (amb un intent de deixar de fumar durant el darrer any).
- Fumi **10 cigarretes o més** al dia i tingui un **nivell alt de dependència** segons el test de *Fagerström* (5 punts o més en la forma breu del test de 2 preguntes, 7 o més en la forma extensa de 6 preguntes)..

A més, cal que es compleixin les següents condicions:

- La prescripció queda restringida als professionals adscrits a qualsevol centre d'**atenció primària** (inclosos els equips sanitaris de centres penitenciaris i de justícia juvenil), a un **hospital de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense fum** o a una **unitat de deshabitució tabàquica** dels Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS).
- Es finança **un intent anual** per deixar de fumar amb tractament farmacològic per pacient.
- La prescripció i dispensació s'ha de realitzar per **recepta electrònica**.
- El tractament consta d'una única prescripció, que és **un envàs i amb una durada màxima de 25 dies**.

Només en cas que el pacient compleixi les condicions esmentades anteriorment, el metge haurà de marcar l'opció de finançament quan prescriu el tractament.

La prescripció d'aquest tractament ha d'anar lligada al diagnòstic de fumador o a un de relacionat que l'usuari tingui actiu.

Com s'ha de prescriure el Todacitan® (citisina)?

Per conèixer informació de la pauta del medicament, cal clicar a:

Aquesta informació es pot imprimir.

En cas que se superi la durada màxima del tractament i/o el nombre d'envasos previstos, SIRE rebutjarà la prescripció i apareixerà un missatge d'error.

## Recordeu que:

- A la intel·ligència activa, dins l'actuació *Tabaquisme*, hi ha les variables de registre de l'hàbit tabàquic.
- Es pot accedir al formulari per poder fer el seguiment de la deshabitució tabàquica des de:
  - La variable *Voldria deixar de fumar?* De l'actuació *Tabaquisme*.
  - La intervenció Consell per deixar de fumar del Pla de cures: *Deixar de fumar*.