


Risc d'administració incorrecta de la nitroglicerina en comprimits recoberts sublinguals

S'ha afegit un avís a l'ECAP amb les recomanacions d'administració per aquests medicaments.

Temps de lectura: 1 minut.

La nitroglicerina d'administració sublingual està indicada en el tractament de l'angina de pit i en la prevenció del dolor anginos davant l'esforç o altres situacions que el poden desencadenar. Al nostre entorn hi ha disponibles dos medicaments de nitroglicerina sublingual, Cafinitrina® i Solinitrina®. Ambdós medicaments es presenten en forma de comprimits recoberts sublinguals que **cal mastegar abans de posar-los sota la llengua**, per garantir-ne una velocitat d'absorció i d'inici d'efecte adequats.



Per tal d'evitar els riscos derivats d'una administració incorrecta del medicament, **es recomana als professionals sanitaris:**

- **Preguntar als pacients** que reben tractament amb Cafinitrina® o Solinitrina® com se la prenen.
- **Explicar al pacient** en el moment de la prescripció que els comprimits de nitroglicerina sublingual s'han de mastegar abans de posar-los sota la llengua.
- **Recordar al pacient** que en cas de no mastegar abans el comprimit, la dissolució pot ser més lenta i endarrerir l'inici de l'efecte del medicament.
- **Indicar al pacient** que no mastegar el comprimit abans de posar-ho sota la llengua augmenta el temps de contacte amb la mucosa sublingual i podria produir lesions.

Al mòdul de PREFASEG de l'ECAP/ .NET s'ha introduït un avís de seguretat relacionat amb aquest risc i amb les recomanacions a seguir per part dels professionals sanitaris.

Recordeu la importància de notificar les sospites de reaccions adverses a medicaments al Centre de Farmacovigilància de Catalunya a través de la Targeta Groga.

Per a més informació consultar:

<https://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/seguretat/>